

Trastorno del Espectro Hiperlaxo (TEH)

Hypermobile Spectrum Disorders (HSDs)

Recientemente Castori, et al. han descrito el **Trastorno del Espectro Hiperlaxo**. Esta descripción agrupa a enfermos del colágeno, que no clasifican para ninguno de los 13 tipos de Ehlers-Danlos, y que tampoco se conoce el gen causal. La mayoría de estos pacientes tiene criterio de Brighton negativo, excepto el tipo generalizado.

Hay 4 tipos de TEH:

| | <u>Sigla en español</u> | <u>Sigla en inglés</u> | <u>Crit. De Brighton</u> |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| – | | | |
| 1.- Generalizado | GTEH | GHSD | (+) |
| 2.- Periférico. | PTEH | PHSD | (-) |
| 3.- Localizado. | LTEH | LHSD | (-) |
| 4.- Histórico. | HTEH | HHSD | (-) |

En el localizado se afectan una o pocas articulaciones.

En el periférico se afectan, sólo manos y pies.

En el generalizado, se afectan muchas a articulaciones.

En el histórico esta positiva la prueba de las 5 preguntas de Hakin y Grahame.

Para efectos prácticos, e tratamiento del TEH, es como el del SED hipermovible.